



MESOHEAL

PINK GLOW

Anında göz alıcı ve güzel bir cilt
Anında doğallıkla ışıldayan bir cilt
Natural skin radiance instantly





AMİNO
ASİTLER

VİTAMİNLER

HİYALÜRONİK
ASİT

MİNERALLER

KOENZİMLER

GLUTATYONLAR

NÜKLEİK
ASİT

ANTİOKSİDANLAR

Stabil Olmayan Hiyalüronik Asit %0.3

Kayda değer bir nem biriktirme etkisi ile anti-enflamatuar, canlandırıcı ve vasküler sabitleyici etkilere sahiptir. Aynı zamanda güçlü bir antioksidandır.

13 Vitamin

A, C, E, I, B Kompleksi -

Ciltte elastikiyet ve sıkılık üzerinde pozitif etkilere sahiptir, ciltte dengeyi sürdürür, ciltte değişim süreçlerini destekler, kolajen sentezini uyarır, damar duvarlarını güçlendirir, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir, aynı zamanda hiperpigmentasyon belirtilerini azaltır.

Koenzim Kompleksi -

Ciltte metabolik ve rekonstrüktif süreçleri hızlandırır. 23 amino asit kompleksi ve bu komplekslere ilişkin bileşenler, protein ve özellikle kolajen sentezi sürecinde etkin rol oynar. Bu, genç cilt hücreleri için bir tür "temel yapı taşı"dır.

Nükleosit Kompleks -

Bu kompleks bir tür bilgi taşıyıcı görevi görür ve protein sentezleme aşamasında zincir içinde amino asit bileşenlerinin sıralamasını kontrol altına alır.

Mineral Kompleks -

Sayısız hücresel işlevleri düzenler, epidermis ve dermis iyonik hücre dengesini normalleştirir ve metabolik süreçleri iyileştirir.

Antioksidanlar

(Vitamin C, Glutatyon) -

Epidermis ve dermis hücrelerinde serbest radikallerin oksidasyonunu durdurur.

01

Indications
for use

1. Ciltte yaşa bağlı değışikliklerde düzelme
(Hafif ve orta kırışıklıklar, atrofi, ciltte laksite, mikroreliyefin hizalanması).
2. Ciltte aşırı hidrasyon ve herhangi bir etiyoloji sonucu ciltte dehidrasyonun tedavisi.
3. Güneşe aşırı maruz kalma öncesi cildi hazırlama, cilde maruz kalma sonrası aktif rehabilitasyon terapisi.
4. Ciltte dolaşım bozuklukları (kuperoz).
5. Yaşlanma ve foto-yaşlanmanın erken belirtilerinin önlenmesi ya da düzeltilmesi.
6. Hormonal değışimler sırasında ciltte dejeneratif değışimlerin önlenmesi.
7. Kimyasal peeling, lazer, mekanik cilt soyma ve estetik cerrahi sonrası rehabilitasyona hazırlık.

02

Terapi Protokolü ve Tatbik
Tekniği

Süreci 3 seans ile
tamamlamak tavsiye
edilir:

1. Seans	2. Seans	3. Seans
7-15 günlük ara ile 3-4 prosedür	1 aylık ara ile 2 prosedür	Her 2-6 ay 1 veya 2 destek prosedürü

Enjeksiyon Teknikleri:

Geriye doğru çizgisel

Orta düzey nappage

Mikro-papüler

İğneler:

30G x 12 / 13mm

30 / 32G x 6mm

32 / 33G x 4mm



Prosedür

Geriye doğru çizgisel

Orta düzey nappage

Prosedürün her bir aşaması spesifik bir tatbik metoduna dayanır.

Bio-yeniden canlanma ve mezoterapi



1. aşama



Enjeksiyon Tekniği:
Geriye doğru çizgisel enjeksiyonlar

İğne türü:
30G x 12 / 13mm

Yüzeysel kırışıklıkların giderilmesi için çizgisel enjeksiyon:
Dudak hatları, “kazanma” kırışıklıkları, ön ve yan preoriküler kırışıklıklar

30G x 12 / 13mm

Yüzeyel kırışıklıklarda geriye doğru çizgisel enjeksiyon:
Dudak hatları, “kazayağı bölgesi”, kırışıklıkları, ön ve kaş arası bölgeleri ve preoriküler kırışıklar

2. aşama



Enjeksiyon Tekniği:

Mikro-papüler

İğne türü:

30 / 32G x 6 / 12mm

Solüsyonun daha iyi enjekte edilmesi için farklı boyutlardaki papüllerin formasyonu.

Kokteylin enjeksiyon derinliği 2-3mm'dir, iğnenin eğimi 45 derecedir.

Enjeksiyon noktaları arasındaki mesafe 2-4mm'yi geçmemelidir.

3. aşama



Enjeksiyon Tekniği:

Orta Düzey Nappage

İğne türü:

32 / 33G x 4mm

Dermis tabaka; papiller ya da retiküler dermis üzerinde tatbik edilir.

Yüze enjekte edilirken, iğne 45 derece eğimli, derinlik 1 - 1.5mm arası ve enjeksiyon noktaları arasındaki mesafe 1 - 2 cm arasında olmalıdır. Kenarı yukarı bakmalıdır. Enjeksiyon, vasküler patern ya da ileti kanalları dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Her bir enjeksiyonda solüsyon hacmi 0.02 ml'dir. Enjeksiyon bölgelerinde cildin yüzeyinde hafif kanama ya da minör hematoma formasyonu oluşabilir. Aynı şekilde damar duvarlarında da hasar oluşabilir.

04

Kontraendikasyonlar



MESOHEAL
PINK GLOW



- Mezo kokteyl komponentlerine bireysel intolerans
- Enjeksiyon yapılan bölgelerde ciltte hasar
- Antikoagülan tedavi sırasında kanama bozuklukları
- Ateş ya da enfeksiyonel hastalıklar
- Onkolojik rahatsızlıklar
- Hamilelik ve emzirme
- Herpes Enfeksiyonunda eksaserbasyon
- Keloit oluşumuna eğilim
- Otoimmün rahatsızlıklar (Uzmanlardan medikal tavsiye alınmalıdır)

05

Önlemler



Olası advers reaksiyonlar

- Hematom
- Lokal ödem
- Kızarıklık
- Kaşınma
- Ciddi alerjik reaksiyon

PinkGlow ile bir arada uygulanması tavsiye edilmeyen prosedürler

- Kalıcı makyaj
- Botulinum toxin tip A enjeksiyonu
- Radyo frekans ile lifting
- Cilt arındırma

06

Prosedür sonrası 2 haftaya kadar iyileşme tavsiye edilir




- Uzun süre güneşe maruz kalmaktan kaçının, yüksek kalitede bir SPF kullanın.



- Halka açık duşlar ve saunaları kullanmaktan, spor tesisi ve fitness center'a gitmekten kaçının.



- Agresif cilt temizleyiciler kullanmaktan kaçının (scrub, peeling, fırça ve temizleyici ürünler).



- Düzenli olarak anti-inflamatuar ve canlandırıcı etkili bir ajan kullanın.



- Cildinizi çizmekten ya da ovuşturmadan kaçının.

Tedavi sonrası ilk gün, ciltte hafif şişme ve kızarma olabilir. Bu sonuçları azaltmak için anti-inflamatuar ürünler kullanılabilir.

Mezoterapi sırasında oluşan mikropapüller ve enjeksiyon izleri 2-3 gün içerisinde yok olur.

ÜRETİM & TEDARİK

SATIŞ & PAZARLAM

Koru Pharmaceuticals Co., Ltd.

Address: 4F Anam Building, 616 Yeongdong-daero,
Gangnam-gu, Seoul, Korea 06081

Mob: +82-10-7744-0914

Koru Global Sdn. Bhd.

Address: Suite 43A, Level 43, Vista Tower, The Intermark, 348 Jalan
Tun Razak, Kuala Lumpur, Malaysia 50400

Mob: +82-10-7744-0914

E-mail: info@korupharma.com

Web: www.korupharma.com